Allogene Stammzelltransplantation- rekrutierend

Infektionen

TRACE

- Phase III
- Chemo-refraktäre virale Infektionen mit CMV, EBV und Adenoviren nach HSCT
- Original HSCT Spender verfügbar mit viraler Immunantwort
- Alter ab 2 Monaten
- **Ausschluss:** aGvHD > grade II oder ext. cGvHD, Steroidtherapie, gleichzeitige DLI-Gabe, Progress der Grunderkrankung
- **Therapie:** virusspezifische T-Zellen

GvHD

IDUNN/MC-MS.C.1/aGVHD

- Phase III
- Steroid-refraktäre akute GvHD nach HSCT mit Grad II-IV refraktär nach 1. Linie
- Alter ≥ 12 Jahre, Gewicht ≥ 15kg
- **Ausschluss:** solide Tumorerkrankung, Vortherapie mit MSC
- **Therapie:** MSC (MC0518) vs. Best Available Therapy

GvHD

MPOH08_Phoebus

- Phase IIb
- Vermeidung von Komplikationen nach HSCT
- Geeigneter Stammzellspender vorhanden
- Neutrophile > 0.5 G/L; Karnofsky ≥ 70%
- Antibiose in den letzten 90 Tagen
- Alter: 50-99 Jahre
- **Ausschluss:** geplante non-myeloablative Konditionierung (TBI) +/- purine analog, fludarabine + cyclophosphamide oder gleiches oder konventionell myeloablative Konditionierung (z.B. Hochdosis Cyclophosphamide + Hochdosis TBI, Hochdosis Busulfan + Hochdosis Cyclophosphamide; T-Cell Therapie; Alemtuzumab; ...
- **Therapie:** Fekale Mikrobiotherapy – orale Gabe

Nach Entitäten

- Aktuell keine Studien

Kontakt

Prüfärztin: Dr. med. Mareike Verbeek

Studienkoordination: Karin Struppler

Telefon: +49 89 4240 9714

E-Mail: karin.struppler@mri.tum.de