Myeloische Neoplasien I - geplant

AML und MDS

AML Erstdiagnose

AML SG 31-19

- Phase III **Aktivierung Q1/2026**
- New AML, MDS EB-2
- Alter ≥18 Jahre, ECOG 0-2
- **Ausschluss:** APL, PML-RARA, BCR-ABL1
- **Therapie:** Induktion 1+2/
Konsolidierung 7+3
+Venetoclax 400mg d1-14 (Ind I)
Venetoclax 400mg d1-7 (Ind II+
Kons)

AML Erstdiagnose

Evolve-1 HO 173

- Phase III **Aktivierung Q4/2025**
- New AML+IDH1 mut
- Nicht geeignet für
IntensivChemotherapie
- Alter ≥75 Jahre, ECOG 0-2
- **Ausschluss:** Alter 18 – 74 Jahre,
ECOG 2-3, APL, PML-RARA, BCR-
ABL1
- **Therapie:**
Ivosidenib+AZA+VEN/Placebo d1-9
(C1)
Ivo+Aza+Ven/Placebo d1-7 (ab C2)

AML Erstdiagnose

Evolve-2 HO177

- Phase III **Aktivierung Q4/2025**
- New AML/MDS+NPM1 mut
- Nicht geeignet für
IntensivChemotherapie
- Alter ≥75 Jahre, ECOG 0-2
- **Ausschluss:** Alter 18 – 74 Jahre,
ECOG 2-3, APL, PML-RARA, BCR-
ABL1
- **Therapie:**
AZA+VEN+Revumenib/Placebo

AML Erstdiagnose

KO-MEN-017

- Phase III **Aktivierung Q3/2025**
- AML+NPM1 mut.
- Alter ≥18 Jahre, ECOG 0-2
- **Ausschluss:** APL, aktive ZNS-
Beteiligung, WBC >25x10⁹/L
- **Therapie:** intensiv
Arm A: Ziftomenib+7+3 Induktion,
Ziftomenib+Cytarabine Konsolidierung,
gefolgt von Ziftomedib Erhaltung
Arm B: Ziftomenib+7+3 Induktion,
Ziftomenib+Cytarabine Konsolidierung,
gefolgt von Placebo Erhaltung
Arm C: Placebo+7+3 Induktion,
Placebo+Cytarabine Konsolidierung,
gefolgt von Placebo Erhaltung
- **Therapie:** Nicht-intensiv
Arm A: Ziftomenib+Ven+AZA
Arm B: Placebo+Ven+AZA

Kontakt

Prüfärztin: Prof. Dr. Katharina Götze

Studienkoordination: Sandra Eckert

Telefon: +49 89 4140 5736

E-Mail: sandra.eckert@mri.tum.de

Myeloische Neoplasien I - geplant

AML und MDS

AML
Rezidiv / Relaps

- Aktuell keine Studien

AML / MDS
Erstdiagnose

Resolve

- MRD Registerstudie
- New AML or MDS/AML or MDS-IB2
- Geplant für Intensivtherapie und AlloHSCT
- MFC-MRD negative nach Induktion/Konsolidation
- **Ausschluss:** APL, ELN favorable oder adverse risk

MDS
Very low, low, intermediate risk

Momelotinib GSK

- Phase II **Aktivierung Q4/2025**
- Low, intermed. Risk MDS nach EPO/Luspatercept refraktär oder relapsed+Transfusionsabhängigkeit
- **Ausschluss:** HMA, sMDS
- **Therapie:**
Part 1: Dosisfindung von Momelotinib in 2 Armen
Part 2: Anwendung der Dosis aus Part 1

Kontakt

Prüfärztin: Prof. Dr. Katharina Götze
 Studienkoordination: Sandra Eckert
 Telefon: +49 89 4140 5736
 E-Mail: sandra.eckert@mri.tum.de

Myeloische Neoplasien I - geplant AML und MDS

CMML

- Aktuell keine Studien

VEXAS

- Aktuell keine Studien

Kontakt

Prüfärztin: Prof. Dr. Katharina Götze

Studienkoordination: Sandra Eckert

Telefon: +49 89 4140 5736

E-Mail: sandra.eckert@mri.tum.de