

Gastrointestinale Tumore - rekrutierend

Ösophaguskarzinome / AEG / Magenkarzinome

1. Linie

HIPEC/FLOT9 - PREVENT

- Phase III
- Resektables diffuses/mixed-type AEG II-III oder Magen-CA (uT3, uT4a, jedes N, M0 oder jedes T N+ M0), Therapie mit 3-6 Zyklen neoadjuvant FLOT, keine Vor-OP
- Alter 18-75 Jahre, ECOG 0-1
- **Therapie:**
FLOT vs. HIPEC + FLOT
- **Ausschluss:** Leberzirrhose

Ösophaguskarzinome / AEG / Magenkarzinome

1. Linie

PRESTO

- Phase II
- ED AEG I-III, cT2 N0 M0 oder mit OP sowie neoadjuvanter Radio-Chemo Indikator, Tumor muss resektabel sein, PD-L1 und MSI
- Alter ≥ 18 Jahre, ECOG 0-1
- 8 Wochen Durvalumab + FLOT + mFOLFOX, danach Durvalumab mono vs. OP
- **Ausschluss:**
Autoimmunerkrankungen, vorherige Transplantation, Checkpoint Vortherapie

Kolorektale Karzinome

FIRE-8

- Phase II
- metastasiertes kolorektales Adenokarzinom,
- Metastasen irresektabel, RAS WT
- Alter ≥ 18 Jahre, ECOG 0-2
- Lonsurf + Panitumumab vs.
- Lonsurf + Bevacizumab
- **Ausschluss:** Vortherapie, cerebrale Metastasen

Kolorektale Karzinome

FIRE-9 PORT

- Phase III
- kolorektales Adenokarzinom, primär metastasiert
- Primarius und alle Metastasen reseziert oder lokal
- ablatiert (synchron oder metachron)
- Alter ≥ 18 Jahre, ECOG 0-2
- additiv FOLFOX/FOLFIRI vs strukturierte Nachsorge
- **Ausschluss:** bereits > 6 Zyklen FOLFOX (oder FOLFIRI) oder > 4 Zyklen CAPOX/XELOX

Kontakt

Prüfärztin: Prof. Dr. med. Sylvie Lorenzen

Studienkoordination: Sarah Lang

Telefon: +49 89 4140 5145

E-Mail: sarah.lang@mri.tum.de

Gastrointestinale Tumore - rekrutierend

HER2-mutierte oder überexprimierte/amplifizierte solide Tumoren

BI / Beamion PANTUMOR-1

- Phase II
- Alter ≥ 18 Jahre, ECOG 0-1
- Overexpressed/amplified HER2 Tumore-(Kohorte 1-5, 6-agnostisch)
- HER2 Mutationen – (Kohorten 7-9, 10-agnostisch)
- **Therapie:** Zongertinib 120 mg p.o.
- **Ausschluss:** HER2 – überexprimierendes/amplifiziertes (IHC3 + or IHC2+/ISH+) mBC or mGEAC, HER2-mutierte NSCLC, vorherige Therapie mit HER2 TKIs

Pankreaskarzinome

- Aktuell keine Studien

Hepatobiliäre Karzinome

- Aktuell keine Studien

Ösophaguskarzinome / AEG / Magenkarzinome > 1. Linie

BEMARA

- Phase Iia (min. 1. Linie)
- Metastasiertes Adenokarzinom des ösophagogastrischen Übergangs, FGFR2b ICH 2*/3+ in $\geq 10\%$ Tumorzellen
- Alter ≥ 18 Jahre, ECOG 0-1
- Cohort 1: Bemarituzumab + Irinotecan SOC
- Cohort 2: Bemarizumab + Paclitaxel/Ramucirumab SOC
- Cohort 3: Bemarituzumab + Trifluridine / Tipiracil SOC
- **Ausschluss:** vorherige Therapie mit FGF-FGFR Inhibitoren, andere Tumoren (nicht Adenokarzinome)

Kontakt

Prüfärztin: Prof. Dr. med. Sylvie Lorenzen

Studienkoordination: Sarah Lang

Telefon: +49 89 4140 5145

E-Mail: sarah.lang@mri.tum.de