Multiples Myelom - rekrutierend

CAR-T-Zell Therapie

CA0881007/GPRC5D CART

- Phase III
- Rez. Oder refr. MM
- min. 1. Therapielinie vorher (PI, iMiD, anti-CD38 Ab, Lenalidomid refraktär)
- **Therapie:**
 - Arm A: CAR-T-Zell Therapie (GPRC5D)
 - Arm B: SOC

Kontakt

Prüfärztin: PD Dr. med. Judith Hecker

Studienkoordination: Katharina Fehringer

Telefon: +49 89 4140 1261

E-Mail: katharina.fehringer@mri.tum.de

Multiples Myelom - rekrutierend

CAR-T-Zell Therapie

iMMagine-3 / KTUS-679-0788

- Phase III
- Refr. MM
- Mind 1 max. 3 Vortherapien (incl. IMiD and

Kontakt

Prüfärztin: PD Dr. med. Judith Hecker

Studienkoordination: Mandeep Kaur

Telefon: +49 89 4140 8174

E-Mail: mandeep.kaur@mri.tum.de

Multiples Myelom - rekrutierend

Erhaltung nach 1. Linie

DSMM XVIII / GMMG-HD9

- Phase III
- ED MM, post-ASCT
- Z.n. DSMMXIX, Z. n. ASCT, min. PR
- **Therapie:** Iberdomide vs. Iberdomide + Isatuximab

RRMM

CA057-001 / Successor-1

- Phase III
- zweistufig, RRMM
- Alter < 70 Jahre
- 1-3 Vortherapien incl. Lenalidomid
- **Therapie:** MeziVd (Arm A) vs. PVd (Arm B)

1. Linie

ELIAS

- Phase II
- ED MM, R-ISS Stadium I
- Alter 18-70 Jahre, ECOG
- **Therapie:** Arm A 3 Zyklen Isatuximab+VRd, dann SOC vs. Arm B 3 Zyklen Isatuximab+VRd, ASCT, + erneut 3 Zyklen Erhaltung beider Arme mit Isatuximab+Lenalidomid

Kontakt

Prüfarzt: Prof. Dr. Bassermann (DSMM XVIII, ELIAS)
Dr. med Marion Högner (CA057-001)

Studienkoordination: Mandeep Kaur

Telefon: +49 89 4140 8174

E-Mail: mandeep.kaur@mri.tum.de

Stand: 08/2025

Multiples Myelom - rekrutierend

Erhaltung nach 1. Linie

EMN30 Majes Tec-4

- Phase III
- Erhaltung nach ED MM mit ASCT nach einer Therapielinie mit zumindest PR
- Alter ≥ 18 Jahre, ECOG ≤ 2
- **Therapie:** Teclistamab (BCMAxCD3) +/- Lenalidomid oder Lenalidomid alleine in der Erhaltung
Ausschluss: BCMA Vortherapie, Z.n. alloHSCT

Erhaltung nach 1. Linie

MagnetisMM-7

- Phase III
- MRD positive Patienten nach ASCT nach ED MM mit zumindest PR
- Alter ≥ 18 Jahre, ECOG ≤ 1
- **Therapie:** Elranatamab (BCMAxCD3) vs. Lenalidomid in der Erhaltung
- **Ausschluss:** BCMA Vortherapie

1. Linie

EMN33

- Phase II
- Unbehandelten MM, transplantfähig, MRD, unbehandelt
- Alter ≤ 70 , ECOG ≤ 2
- **Therapie:** Part 1: DVRd Induktion Part 2: ASCT und DVRd Konsolidierung vs. DVRd gefolgt von Teclistamab mit Talquetamab (kombiniert)

1. Linie

DSMMXX HD10 Majes TEC-5

- Phase II
- ED MM, transplantfähig
- 18-70 Jahre, ECOG ≤ 2
- **Therapie:** Teclistamab (BCMAxCD3) Induktion Tec-DRd (Arm A) or Tec-DVRd (Arm B) + Erhaltung Tec-DR
- **Ausschluss:** nicht ASCT geeignet

Kontakt

Prüfarzt: Prof. Dr. Bassermann
 Studienkoordination: Katharina Fehringer
 Telefon: +49 89 4140 1261
 E-Mail: katharina.fehringer@mri.tum.de